



GIUNTA REGIONALE

DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
DPD023-Servizio Presidi Tecnici di Supporto al Settore Agricolo
P.zza Torlonia, 90 – 67051 Avezzano

Ufficio Tutela Fitosanitaria delle colture, tel.085.9773532
Sede Villanova di Cepagatti (Pe) 65010
Via Nazionale, 38 Tel 085.9773586 – fax 085.9773581

Villanova di Cepagatti, 27/04/20

Prot. N. RA/ 0423280/20

OGGETTO: Trasmissione DPI - Norme tecniche di difesa delle colture e controllo delle infestanti-
Regione Abruzzo. Aggiornamento Aprile 2020

Al Dipartimento Politiche dello Sviluppo
Rurale e della Pesca
Servizio promozione delle filiere
Ufficio politiche di sostegno alla conversione e al
mantenimento di pratiche biologiche in agricoltura, allo
sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali.
Via Catullo, 17
PESCARA

Si inviano, in allegato per via telematica, per il seguito di competenza, l'aggiornamento al
Disciplinare di Produzione Integrata DPI della Regione Abruzzo, specificando che lo stesso ha
regolarmente ottenuto il parere di conformità dal Gruppo Difesa Integrata operante presso il
Ministero Politiche Agricole, come da comunicazione prot. 0013335 del 22.04.2020.

Distinti saluti

Il Responsabile dell'Ufficio
(Dr. Domenico D'Ascenzo)

REGIONE ABRUZZO

DPI - Norme Tecniche di Difesa delle colture
e controllo delle erbe infestanti
Aggiornamento Aprile 2020

Coltura	Avversità	Sostanza attiva	Limitazioni
Albicocco	Monilia	Isofetamid	Inserire max 2 interventi nel limite degli SDHI
Albicocco	Monilia	Tebuconazolo+trifloxistrobin	Sono consentiti al massimo 2 interventi anno in alternativa a tebuconazolo e tebuconazolo+fluopyram
Castagno	<i>Cydia</i> spp. (<i>Cydia splendana</i> , <i>Cydia fagiglandana</i>), <i>Pammene fasciana</i>	Emamectina benzoato	Inserire max 1 intervento
Ciliegio	Monilia	Isofetamid	Inserire max 2 interventi in alternativa a boscalid e fluppyram
Ciliegio	Monilia	Tebuconazolo+trifloxistrobin	Sono consentiti al massimo 2 interventi anno in alternativa a tebuconazolo e tebuconazolo+fluopyram
Ciliegio	Afide nero	Sali potassici di acidi grassi	
Fragola	Botrite	<i>Aureobasidium pullulans</i>	
Fragola	Botrite	Isofetamid	Inserire max 2 interventi in alternativa a boscalid e fluxapirad. Utilizzabile solo in pieno campo
Fragola	Muffa grigia	Flupyram+trifloxistrobin	Massimo 2 interventi in alternativa a boscalid e penthiopyrad. Utilizzabile solo in pieno campo
Fragola	oidio	Bacillus pumilis	Utilizzabile solo in coltura protetta
Fragola	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Fragola	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	Utilizzabile solo in pieno campo
Mandorlo	<i>Cidia pomonella</i>	Emamectina benzoato	Inserire max 2 interventi
Olivo	<i>Spilotea oleaginea</i>	Azoxystrobin+difenconazolo	Inserire max 1 intervento sulla coltura in alternativa tryfloxistrobin+tebuconazolo
Olivo	<i>Bactroceraoleae</i>	Acetamiprid	Inserire "i trattamenti preventivi (adulticidi): esclusivamente utilizzando esche proteiche attivate con formulati specifici autorizzati a base di deltametrina, spinosad o acetamiprid, eventualmente innescati con feromone, o installando trappole per la cattura massale".
Pero	Maculatura bruna	<i>Trichoderma asperellum</i> +	

		<i>trichoderma gamsii</i>	
Susino	Monila	Fluopyram	Non utilizzabile (refuso)
Susino	Afidi	Sali potassici di acidi grassi	
Vite	Botrite	Isofetamid	Inserire max 1 intervento in alternativa a boscalid
Vite	Oidio	<i>Bacillus amyloliquifaciens</i>	
Vite	Fillossera	Spirotetramat	
Basilico	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in serra
Carciofo	Afidi	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Cicoria	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 in alternativa a spinosad
Cicoria	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in serra
Cocomero	Acari	Terpenoidblend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Cocomero	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Cocomero	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Inserire tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo 2 interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Indivia, scarola	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Insalate	Afidi	Tau fluvalinate	I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 3 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità
Insalate	Nottue	Tau fluvalinate	I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 3 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità
Insalate	Tripidi	Tau fluvalinate	I piretroidi possono essere utilizzati per un massimo di 3 interventi per ciclo indipendentemente dall'avversità
Patata	Dorifora	Tau fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Radicchio	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Radicchio	Ragnetto	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melanzana	Muffa grigia	<i>Aureobasidium pullulans</i>	
Melanzana	Oidio	Flutriafol	Inserire nel limite degli IBE
Melanzana	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melanzana	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura

			protetta
Melanzana	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melanzana	Tripidi,	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Melanzana	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Melanzana	Afidi	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Melanzana	Tripidi	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Melanzana	Nottue	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Melone	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 in alternativa a spinosad
Melone	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melone	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melone	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Melone	Tripidi,	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Melone	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Melone	Afidi	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Melone	Tripidi	Tau-fluvalinate	Con i piretroidi sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità

Peperone	Acari,	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Peperone	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Peperone	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Peperone	Tripidi,	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Peperone	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Pomodoro	Muffa grigia	<i>Aureobadidium pullulans</i>	Sono consentiti massimo 5 interventi
Pomodoro	Alternaria	<i>Bacillus amyloliquefaciens</i>	Utilizzabile solo in coltura protetta
Pomodoro	Nottua gialla	Spinetoram	Inserire max 2 interventi in alternativa a spinetoram
Pomodoro	Acari,	Terpenoid blend QRD 460	Solo in coltura protetta
Pomodoro	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Solo in coltura protetta
Pomodoro	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Solo in coltura protetta
Pomodoro	Tuta absoluta	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti massimo 2 interventi anno in alternativa tra loro indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Sedano	Tripidi	Terpenoidblend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Zucchini	Tripidi	Spinetoram	Inserire max 2 in alternativa a spinosad
Zucchini	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Da utilizzare solo in coltura protetta
Zucchini	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	Da utilizzare solo in coltura protetta
Zucchini	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	Da utilizzare solo in coltura protetta
Zucchini	Tripidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Zucchini	Aleurodidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e cyantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo

			in coltura protetta
Zucchino	Afidi	Cyantraniliprole+Acibenzolar-S-Methyl	Tra clorantraniliprole e ciantraniliprole sono consentiti al massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità. Utilizzabile solo in coltura protetta
Cicorino IV gamma	Acari	Terpenoid blend QRD 460	
Cicorino IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Cicorino IV gamma	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	
Dolcetta IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Dolcetta IV gamma	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	
Foglie e germogli di brassica IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Lattuga a cespo in coltura protetta	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Lattughino IV gamma	Acari	Terpenoid blend QRD 460	
Lattughino IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Lattughino IV gamma	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	
Rucola IV gamma	Acari, Tripidi, Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	
Rucola IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Rucola IV gamma	Aleurodidi	Terpenoid blend QRD 460	
Spinacino IV gamma	Tripidi	Terpenoid blend QRD 460	
Grano tenero e duro	Ruggini	Procloraz+tebuconazolo+fenpropidin	
Grano tenero e duro	Oidio	Procloraz+tebuconazolo+fenpropidin	
Grano tenero e duro	Septoria	Procloraz+tebuconazolo+fenpropidin	
Floricole	Tripidi	ciantraniliprole	Massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Floricole	Nottue fogliari	ciantraniliprole	Massimo due interventi anno indipendentemente dall'avversità
Mirtillo	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura

			protetta
Lampone	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Ribes e uva spina	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Rovo inerme	Acari	Terpenoid blend QRD 460	Utilizzabile solo in coltura protetta
Diserbo			
Fagiolo	Pre-emergenza	Aclonifen	
Grano	Post-emergenza graminacee e dicotiledoni	Thiencarbazone	
Girasole	Pre-emergenza	Metobromuron	
Drupacee		Diflufenican	Eliminare nota utilizzabile solo in impianti in allevamento (refuso)
Vite		Diflufenican	Eliminare nota utilizzabile solo in impianti in allevamento (refuso)